





ENFERMIDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Estas infeccións transmítense principalmente a través das relacións sexuais sen protección e poden ter graves consecuencias para a saúde se non se tratan a tempo e de maneira adecuada.

SÍFILIS



É unha infección bacteriana que progresa en etapas se non se trata.


Comeza cunha chaga na zona xenital chamada chancro que non adoita ser dolorosa.

VIH

Debilita o sistema inmunitario e pode causar SIDA se non se trata, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Existen tratamentos que permiten levar unha vida longa e saudable.

CLAMIDIASE



É unha infección bacteriana común que pode causar complicacións graves se non se trata.

Os síntomas pueden incluír dolor ao orinar, secreción e dor abdominal.
Pode non dar síntomas.

Trátase con antibióticos.


HERPES XENITAL

É causado polo virus do herpes simple.

Provoca feridas dolorosas na zona xenital.

Non ten cura, pero hai tratamentos para aliviar os síntomas.

GONORREA



É unha infección bacteriana que afecta aos xenitais, a gorxa e o recto.


É una bacteria bastante resistente.

Os síntomas poden incluír secreción anormal, dor ao orinar e sangrado.

VPH


O virus do papiloma humano (VPH) pode causar verrugas xenitais e aumentar o risco de cancro de útero.

Os síntomas poden incluír verrugas, picazón e cambios na pel.





ENFERMIDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL




Estas infeccións transmítense principalmente a través das relacións sexuais sen protección e poden ter graves consecuencias para a saúde se non se tratan a tempo e de maneira adecuada.

TRICOMONÍASE

Un parasito, en concreto protozoos da especie *Trichomonas vaginalis* que pode provocar picor, ardor e fluxos de mal cheiro nas mulleres.

Nos homes é asintomática.

Trátase con antiparasitarios.



CANDIDÍASE

Un fungo da especie *Candida albicans* pode causar irritación e picor.

Non sempre se transmite sexualmente, pero pode aparecer tras as relacións sexuais.

Trátase con antifúnxicos.

PIOLLOS PATOS

Pequenos parasitos que viven na pel ou na peluxe pubiana aliméntanse do sangue que absorben na pel, causando proído intenso.

Trátanse con xabóns que destrúen os parasitos e os seus ovos.

